

松本協立病院 **【心臓CT検査】** を受けられる方へフリガナ
氏名

年 月 日生

検査日時 月 日 曜日 時 分

※ 検査の**1時間前**に受付を済ませて下さい。当日は予約時間より多少ずれることがあります
ご了承下さい。

当日、この用紙と紹介状、保険証を総合受付にお出し下さい。

この検査は、心電図により心臓の動きを捉え、ヨード造影剤を点滴して心臓の筋肉を栄養している冠動脈の形態や、石灰化の有無、血流などを評価します。撮影前に冠動脈を広げる薬や、脈を少し遅くする薬を使用します。検査中は体を動かさないようにして下さい。また、検査の間は何回か息止めをお願いします。検査時間は早ければ30分程度ですが、脈の状態により1時間程度かかることがありますので、あらかじめご了承下さい。

《注意していただくこと。必ずお読み下さい》

* 検査前の食事について

午前の検査：朝食をとらないで下さい。水は普通に飲んで下さい。**午後の検査**：昼食をとらないで下さい。水は普通に飲んで下さい。* **検査前12時間はカフェイン製品（コーヒー、紅茶、お茶など）を取らないでください。**

* 水分はお取りいただいて結構ですが、同じ日に他の検査も受けられる方はご注意下さい。

* **お薬手帳をお持ちの方は、必ずご持参下さい。**

* 医師の指示がない限り、内服中の薬はお飲み下さい。

ただし、糖尿病の持病があり、ビッグナイト系薬剤を内服している方は、検査の前日、当日、翌日、翌々日の計4日間は休薬が必要となります。

* 以前に造影剤を使った検査で気分が悪くなったことがある方は、検査前にお知らせ下さい。

* 造影剤は、尿となって体外に出ます。検査後は水分を多めに取って下さい。

* 下記のような造影剤の副作用がみられましたら、当院に連絡、または受診して下さい。

《造影剤の副作用》 検査中または検査後しばらくしてから副作用が出ることがあります。

* 軽い副作用（頻度は3～5%）

吐き気、嘔吐、頭痛、めまい、じん麻疹、発疹、かゆみ、手足のむくみ、発熱、せきなど

* 重い副作用（頻度は約2500人に1人）

ごくまれに呼吸困難や血圧低下などが生じることがあります。

* 腎機能の状態に応じて、長時間の点滴（目安：5時間）をすることがあります。

松本協立病院 松本市巾上9-26 TEL 0263-35-6999(地域連携室直通)

