


内視鏡を用いた
不整脈による脳梗塞
予防手術をお勧めする理由



01 POINT 不整脈によって起こる
脳梗塞を98%予防※

02 POINT 血液をサラサラにする
薬を98%中止可能※

03 POINT 身体の負担が少なく
傷跡が目立たない

04 POINT 手術時間30分
入院期間は概ね3日間※

05 POINT 2022年4月から
保険適用に

心臓血管外科 医師



アオキ マサカズ
青木 雅一 診療部長


2000年 東邦大学医学部卒業
東邦大学大森病院 胸部心臓血管外科
2004年 豊橋ハートセンター 心臓血管外科
2006年 川崎幸病院 大動脈センター
2008年 豊橋ハートセンター 心臓血管外科
2012年 松本協立病院 心臓血管外科 診療部長
2015年 新東京病院 心臓血管外科 診療部長
2016年 さいたま十字病院 心臓血管外科 副部長
2019年 現職 松本協立病院 心臓血管外科 診療部長



ヤマシタ ヨシタケ
谷島 義章

2002年 早稲田大学第一文学部文学科卒業
2011年 三重大学医学部医学科卒業
2011年 菊名記念病院 初期研修
2013年 東京女子医科大学病院 心臓血管外科
2014年 相澤病院 心臓血管外科
2015年 現職 松本協立病院 心臓血管外科

アクセス



〒390-8505 松本市巾上9-26

Tel. 0263-35-5300 [患者さま専用ダイヤル]

Tel. 0263-35-5333 [病院代表]


心臓血管外科外来日 火曜日・水曜日

2022年4月 保険適用

内視鏡を用いた
不整脈による脳梗塞
予防手術のご案内



不整脈に対する
最新の外科治療




心臓血管外科
CARDIOVASCULAR SURGERY

※ Toshiya Ohtsuka et al. 「Thoracoscopic stapler-and-loop technique for left atrial appendage closure in nonvalvular atrial fibrillation: Mid-term outcomes in 201 patients.」 J Heart Rhythm. 2018 sep15(9);1314-1320.

心房細動と脳梗塞


脳梗塞の2割が「心房細動」という不整脈が原因であることが知られています。ありふれた病気ですが、不整脈が原因で心臓の中に血栓（血の固まり）ができ、それが血管を通過して運ばれ、脳梗塞を引き起こすことがあります。脳梗塞は命に関わる病気で、助かったとしても麻痺などの重い合併症が残ります。従来は心房細動になると、血液をサラサラにする薬を一生飲み続けなければなりません。しかし血液サラサラの薬を飲んでいても脳梗塞を起こしてしまう方や、薬の副作用で大出血を起こして、亡くなる方も少なくありません。



心房細動によって血液サラサラの薬を継続的に服用されている方は、お気軽にご相談ください。



内視鏡手術の様子




詳しくは
ホームページを




実際の手術動画が
みれます

2022年4月 内視鏡を用いた左心耳閉鎖術が保険適用に！

血栓の99%が「左心耳（さしんじ）」という心臓の一部にできると言われており、その「左心耳」を内視鏡を使って閉鎖（もしくは切除）する手術が、新たに保険適用となりました。1cm程度の小さな穴から手術を行い、体の負担が少なく、傷跡も目立ちません。この手術の開発者である大塚俊哉先生は2008年以降、2000人以上の方にこの手術を行っており、脳梗塞回避率は



3D-CT画像（左）左心耳切除前（右）左心耳切除後



当院で手術を受けられた方術後1カ月の傷

手術になった方の9割以上が脳梗塞やサラサラの薬による出血を一度でも起こして、再発におびえて生活していた方々でした。この手術が保険適用となった現在、一人でも多くの患者様が、この治療の恩恵を得られることを願っています。

98%、血液をサラサラにする薬を中止できた方は98%、手術時間30分、入院期間は概ね3日間と報告しています。*当院でも2019年よりこの手術を開始しています。

心房細動による脳梗塞、血液サラサラの薬による出血合併症（脳出血、下血、吐血、血尿など）に苦しんでいる患者さんに新たな治療の選択肢が増えました。